

PCA MORFINA

Dilución.....

PESO: \_\_\_\_\_ Kg

Hoja N°: \_\_\_\_\_

PCA FENTANILO

Dilución.....

	Inicio	1ª revisión	2ª revisión	3ª revisión	4ª revisión	5ª revisión	6ª revisión	7ª revisión	8ª revisión
<b>Dia/hora</b>									
Horas transcurridas									
Consumo (ml)									
Consumo (mcg/kg/h)									
Nº bolos intentados									
Nº bolos administrados									
Calidad (analgesia) por el paciente: (0-4) (0-10)									
Calidad (analgesia) por la enfermería: (0-4) (0-10)									
Efectos secundarios									

<b>PARÁMETROS A FIJAR</b>	Pauta inicial								
Dosis en infusión (mcg/kg/h)									
Velocidad de infusión (ml/h)									
Dosis bolo (mcg/kg)									
Volumen de bolo (ml)									



- 0-No dolor
- 1-Dolor leve
- 2-Dolor moderado
- 3-Dolor importante
- 4-Dolor excesivo



# TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS

## Depresión respiratoria

O<sub>2</sub> en gafas/ mascarilla/ mascarilla con reservorio

Bolsa autoinflable/ intubación

Naloxona (reversión parcial 1-2 ug/kg, reversión completa 10-20 ug/kg y doblar dosis en 1-2 min)

## Rigidez muscular

Nada/ Naloxona

## Náuseas o vómitos

Ondansetron (0,1-0,2 mg/kg/6-8 hs vo, iv, máx. 4-8 mg/dosis)

Metoclopramida (0,1-0,2 mg/kg/6h vo, iv, máx. 10 mg/dosis)

## Prurito

Hidroxicina vo (0,5 mg/kg/6 hs, máx.25-100 mg/ 6-8 hs)

Difenhidramina iv (1,25 mg/ kg/ 6 hs, máx.50 mg/ dosis)

## Retención urinaria

Betanecol (0,05 mg/kg/8 hs sc) / Valorar sondaje vesical

## Dispepsia

Omeprazol (vo, iv: 1 mg/kg/12 hs, máx. 40 mg/24 hs)

## Cefalea\*

## Confusión\*

## Insomnio o somnolencia\*

## Estreñimiento\*

## Sequedad de boca\*

## Sudoración\*

*\*Valorar suspender/ ajustar dosis de Fentanilo/Morfina y/o tratamiento sintomático*